



Instrucciones posteriores a la inserción para hombres

Nombre: _____ Fecha de nacimiento: _____

- El lugar de la inserción se ha cubierto con dos capas de vendas. La capa interior es una tira estéril y la capa exterior es un apósito impermeable.
- Puede presentar hematomas, hinchazón o enrojecimiento en el lugar de la inserción que pueden durar desde unos días hasta 2 o 3 semanas. Si el enrojecimiento empeora después de los primeros 2-3 días, comuníquese con el consultorio.
- Su médico le ha recomendado no tomar baños de tina ni meterse en jacuzzis o piscinas durante 7 días. Puede ducharse, pero no retire la venda ni las tiras esterilizadas durante 7 días.
- El bicarbonato de sodio presente en la anestesia puede provocar que la zona se inflame durante 1 a 3 días.
- En caso de inserción en el costado: Su médico le ha aconsejado no utilizar la zona afectada en actividades como remo, golf, ejercicios para la zona lumbar o torsiones abdominales. Puede utilizar los músculos inferiores de los glúteos y las piernas y el tren superior.
- Puede sentir incomodidad en el lugar de la inserción durante 2 a 3 semanas. Si hay picazón o enrojecimiento, comuníquese con su médico para obtener más instrucciones.
- Es posible que note una decoloración rosada o sanguinolenta en la venda exterior. Esto es normal.
- Si presenta sangrado de la incisión, aplique presión firme durante 5 minutos.
- Llame si presenta algún sangrado que no se alivie con presión (no supuración), ya que esto NO es normal.
- Llame si le sale pus del lugar de la inserción, ya que esto NO es normal.
- Llame si la zona se pone roja y caliente al tacto.
- Recomendamos colocar una bolsa de hielo en la zona donde se encuentran los pellets un par de veces por unos 20 minutos cada vez durante las siguientes 4 a 5 horas. Puede continuar haciendo esto para la hinchazón, si es necesario. Asegúrese de colocar algo entre la bolsa de hielo y la venda o la piel. No coloque bolsas de hielo directamente sobre piel desnuda.

RECORDATORIOS

- Recuerde hacerse el análisis de sangre posterior a la inserción 1 o 2 semanas antes de la próxima inserción y según le indique su proveedor de atención médica.
- La mayoría de los hombres necesitarán volver a insertarse pellets entre 4 y 5 meses después de la inserción inicial. Si presenta síntomas antes de esto, llame al consultorio.
- Llame tan pronto como los síntomas que fueron aliviados por los pellets comiencen a regresar para concertar una cita para su próxima inserción.

INSTRUCCIONES ADICIONALES

RECONOZCO QUE HE RECIBIDO UNA COPIA Y ENTIENDO LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO.

PACIENTE:

Nombre en letra de imprenta: _____

Firma: _____ Fecha: _____

TESTIGO:

Nombre en letra de imprenta: _____

Firma: _____ Fecha: _____